




ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର



MICRO PLANNING

1 Stress


MICRO PLANNING

2 Resources



MICRO PLANNING

3 Planning Integration



“ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ରେ
କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ରୋଜଗାରର
ଏକ ଉପଯୋଗୀ ମାଧ୍ୟମ”



- 1 ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ
- 2 ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା

- 3 ନିୟମିତ ଟୀକାକରଣ
- 4 ଆୟ ବ୍ୟୟ ର ହିସାବ ରଖିବା

କୁକୁଡ଼ା ର ସୁସମ ଖାଦ୍ୟ




ଖାଦ୍ୟ ର ପ୍ରକାର	ଉପକାରିତା	ଭୟ/ମାଧ୍ୟମ
ଶକ୍ତି ଜାତୀୟ	ଶରୀର ର ଉତ୍ତମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଓ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଗତି କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।	ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ଏବଂ ସେ ଗୁଡ଼ିକର କୁଣ୍ଡା, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଡ଼ି ଆଳୁ, କଦଳୀ ର ମୂଳ, ଚେର ଓ ମୂଳ ଜାତୀୟ ଫସଲ ।
ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ	ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ।	ଭଲ ଛୋଟ ପୋକ, ମାଛକାଟି ଶାଗ ପତ୍ର, ମଟର, ପିଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆ ଗଜା, ତାଳ ଇତ୍ୟାଦି ।
ଧାତବ ଯୁକ୍ତ	ହାତ ଓ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳପା ଗଠନ କରିବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ।	ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଆଦି ର ଖୋଳପା, ହାତ ଓ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳପା ର କ୍ଷୟାଂଶ ।
ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ	ହାତ ଓ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳପା ଗଠନ କରିବା ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି କରାଏ, ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ରେ ଓ ଚିଆଁ ପୁଟାଇବା ରେ ସହାୟକ ହୁଏ ।	ସବୁଜ ପତ୍ର ଯଥା : ସଜନା ପତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଗ ପତ୍ର, ଆଜୋଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆଦି ।

ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଲା ପ୍ରଧାନ ରୋଗ ଓ ତା'ର ଟୀକାକରଣ



ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟୀକା କରଣ କରା ଗଲେ ରାଶୀକ୍ଷେତ୍ର, କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ ଆଦି ରୋଗ କୁ ପ୍ରତିହିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
ସେହିପରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ା ରୋଗକୁ ଏଡାଇ ଦିଆ ଯାଇ ପାରିବ ।

ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ରେ - ଚିଆଁ ର ପ୍ରବନ୍ଧନ



ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ର (ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ)
ଏକ ଲିଟର ପାଣି ରେ 1 ଟାମଟ ହଳଦୀ
ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ



ଟୀକାକରଣ ର ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବ ରୁ
କୃମୀ ନାଶକ ଔଷଧ ଦେଇ କୃମୀ
ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ



ଜାଲି ପବନ ଚଲାଚଳ ହେଲା ପରି
ହୋଇଥିବ ଜାଲି ଓ ଚଳ ଚଟାଣ ନିୟମିତ
ସଫା କରି ମୃତ୍ୟୁ ରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା

ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିଆଁ ଜଳ ର ପରେ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରତି ମାସ ରେ ଟୀକାକରଣ ତା ପରେ ପ୍ରତି ଦୁଇ ମାସ ରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ।
କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ ପାଇଁ ଚିଆଁ ଜଳ ର ଦୁଇ ମାସ ବର୍ଷ ରେ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ।

କୁକୁଡ଼ା ର ବୟସ (ସପ୍ତାହ ରେ)	ଆବଶ୍ୟକ ଦାନା ପ୍ରତି ଦିନପ୍ରତି ଚିଆଁ (ଗ୍ରାମ ରେ)
ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ	10-15 ଗ୍ରାମ
ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ	15-20 ଗ୍ରାମ
3-4 ସପ୍ତାହ	25-30 ଗ୍ରାମ
5-8 ସପ୍ତାହ	50 ଗ୍ରାମ

ଚିଆଁ ପାଇଁ ଦାନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ର ବିଧି (0-8 ସପ୍ତାହ)		
ଖାଦ୍ୟ ର ପ୍ରକାର	ଦରକାରୀ ଫସଲ/ ଦ୍ରବ୍ୟ	ପ୍ରତିଶତ
ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ	ମକା, ବାଜାରା, ଜୋଝାର	50-70%
ତେଲ ପିଡିଆ	ଚିନା ବାଦାମ, ରାଶି, ସୋଲାବିନ, ସୋରିଷ	20-30%
ମାଛ ଚିଆରି ଖାଦ୍ୟ	ଶୁଖା ମାଛ	10%

ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ର ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଧି



ଚିଆଁ ଜଳ ହେବାର 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପିଇବା ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ



ପ୍ରତି 15 ଦିନ ରେ ଥରେ ମୁଠାଏ କଲରା ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ 1 ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ

କୁକୁଡ଼ା କୁ ଚର୍ମ ଉକୁଣୀ 10 ଖଣ୍ଡ ବର ପତ୍ର ସହ 3 ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ କୁକୁଡ଼ା ର ମୁଣ୍ଡ କୁ ଛାଡି ବୁଡାଇ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ



ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗନେଟ (KMNO4) ରେ ଘା ସଫା କରି ହଳଦୀ ଓ ନିମ୍ବ ର ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ



କୁକୁଡ଼ା ଶ୍ବାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ 10 ଗ୍ରାମ ଅଦା, ହଳଦୀ, ରସୁଣ, 5 ଟି ଗୋଲମରିଚ କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିଅନ୍ତୁ 5 ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ



ଘା ବା କଟି ଗଲେ ଫିଟିକିରି ଗୁଣ୍ଡ ରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ନିମ୍ବ ତେଲ ଓ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ



କ୍ୟାଲସିୟମ ର ଦୂର ପାଇଁ ଅଣ୍ଡାଖୋଲ ଚୁର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତୁ



କୃମୀ ପାଇଁ 100 ଗ୍ରାମ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି ଶୁଖାଇ ଦାନା ସହ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ



ଝାଡ଼ା ହେଲେ କୋରେଇ/ ଲହୁଣିବ ଗଛ ର ଛାଲି ର ରସ 2 ଥର 3 ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ

ପତଳା ଝାଡ଼ା ପାଇଁ 5 ମିଲି ଲେମ୍ବୁ ଓ 10 ମିଲି ଦେଶୀ ମଦ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ



ଝାଡ଼ା ହେଲେ କୋରେଇ/ ଲହୁଣିବ ଗଛ ର ଛାଲି ର ରସ 2 ଥର 3 ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ

ଧଳା ଝାଡ଼ା ପାଇଁ 0.1% ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗନେଟ (KMNO4) 5 ବୁନ୍ଦା ବଡ଼, 3 ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟମ, 2 ବୁନ୍ଦା ଚିଆଁ କୁ 3 ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ



(ଖରା ଦିନେ) ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଘି କୁଆଁରୀ ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ଝାଡ଼ା ହେଲେ 2 ବୁନ୍ଦା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ (LIV-52)



ଖରା ଦିନେ ଦାନା ସହ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ

ନିମ୍ବ ପତ୍ର ରସ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ 4: 1 ମାତ୍ରା ରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ 1 ଭାଗ ରହିଲେ ଛାଣି ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇ ପାରିବ



ମାଛ ଚାଷ ର ଛଅ ସୂତ୍ର

ଉତ୍କଳ ପଙ୍କଜି ରେ ମାଛ ଚାଷ



ହଳ କରିବା



ତୁନ ପକେଇବା



ପି. ଏଚ୍. ପରୀକ୍ଷା



ପୁରକ ପରୀକ୍ଷା



ଖାଦ୍ୟ ଦେବା



ବୃଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା


ମାଛ ଛାଡ଼ିବାର ଅନୁପାତ

ଭାକୁର - 30%

ରୋହି- 30%

ମିରିକାଲୀ -20 %

ଗ୍ରାସ କ୍ରାପ- 20 %



ବନ୍ଧ ରେ ଯଦି ଅଧିକ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି - ଗ୍ରାସ କ୍ରାପ

ବନ୍ଧ ଯଦି ଗଭୀର ଅଛି - ରହୁ ଓ ଗ୍ରାସ କ୍ରାପ

ବନ୍ଧ ର ପାଣି କାଦୁଅ ଓ କମ ଗଭୀର ଥିବ- କମନ କ୍ରାପ




ମାଛର ଖାଦ୍ୟ


ମାସ	% ମାଛର ଓଜନ ଅନୁଯାଇ
୧ ଓ ୨ ମାସ	୩ %
୩ ଓ ୪ ମାସ	୨ %
୫ ଓ ୬ ମାସ	୧ %
୭ ମାସ ପରେ	୦. ୫ %

ସୋରିଷ / ଅଳସି ପିଡ଼ିଆ / କଦଳୀ/ ଶିମିଳି କନ୍ଦା ପତ୍ର / ଘାସ
ମକା ଗୁଣ୍ଡ / କୁଣ୍ଡା / ମାଛ ପୁଟା / ଉଇ / ପରିବା ଚୋପା

ଜଳର ପି.ଏଚ୍. ପରୀକ୍ଷା




ମାଛର ବିବିଧତା




ଶିଙ୍ଘୀ



କେରାଣ୍ଡି



ବାମି



ମାଗୁର



ବାଲିଆ


ଛେଳି ପାଳନ



ଓଜନ କରି ବିକ୍ରି କରିବା (ଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି)



ଛେଳି ମାଂସର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଗୁଣ





ଛେଳି ପାଳନ

- ଛେଳି ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ଠାରୁ ଆମେ ମାଂସ ,କ୍ଷୀର ,ଚମଡ଼ା ,ଲୋମ ଓ ଜୈବିକ ଖତ ପାଇଥାଉ
- ଯଉ ପରିସ୍ଥିତି ରେ ଗାଈ ପାଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାଏ , ସେଠାରେ ଛେଳି ପାଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ
- ଛେଳି ମାନେ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିପାଳନ କୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳି ପାରନ୍ତି
- ଏଥି ପାଇଁ ବହୁତ କମ ମୂଲ୍ୟ ଧନ ଲାଗି ଥାଏ
- ଛେଳି ଆକାର ରେ ଛୋଟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଶିଶୁ ତେଣୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ ପିଲା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ
- ଛେଳି ଗୁହାଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ନୁହେଁ
- ଛେଳି ଦାନା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘାସ ,ପତ୍ର ,ଲଟା ,ବୁଦା ଚରି ବୁଲି ଖାଆନ୍ତି
- ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଯାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ :

୧. ରାତ୍ରିକାଳୀନ ବାସଗୃହ ବା ଛେଳି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା
୨. ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା
୩. ନିୟମିତ ଚୀକାକରଣ
୪. ଆୟ ବ୍ୟୟ ହିସାବ ରଖିବା

ଛେଳି ମଡ଼କ (ପି.ପି.ଆର)

ଲକ୍ଷଣ :

- ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ
- ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପାଟିରେ ଘା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ
- ଆଖି ରୁ ନେଞ୍ଜରା,ନାକ ରୁ ସିଂଘାଣି ,ପାଟି ରୁ ଲାଲ ପ୍ରତୁର ପରିମାଣ ରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ
- ନିଶ୍ୱାସ -ପ୍ରଶ୍ୱାସ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ , ଛିଙ୍କ ହୁଏ
- ଆରମ୍ଭ ହେବାର ତିନି ଚାରି ଦିନ ପରେ ତରଳ କିମ୍ବା ନାଳ ରକ୍ତ ମିଶା ଝାଡ଼ା ହୁଏ

ନିରାକରଣ :

- ଏହା ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇ ଥିବାରୁ କେବଳ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଉପସର୍ଗ କରାଯାଇ ଥାଏ
- ରୋଗ କ୍ରାନ୍ତ ଛେଳି କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ବିଧେୟ
- ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଥାଏ

ଛେଳି ବସନ୍ତ

ଲକ୍ଷଣ :

- ଛେଳିକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇ ଥାଏ
- ଜ୍ୱରହେବାର 2 ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରର ଲୋମ ନ ଥିବା ଜାଗା ରେ ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ
- ମୁହଁ,ପନ୍ଥା ଆଦି ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଶରୀର କୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ
- ଆଖି ରୁ ନେଞ୍ଜରା,ନାକ ରୁ ସିଂଘାଣି ବାହାରେ

ନିରାକରଣ :

- ରୋଗ କ୍ରାନ୍ତ ଛେଳି କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ
- ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିବାଇଓଟିକ ମଲମ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ
- ପାରିସ୍କାର ପାରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ
- ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ

ସାହାଣୀ

ଲକ୍ଷଣ :

- ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱର ହେବା ସହିତ ଗଳା ଫୁଲି ଯାଇ,ପାଟି ରୁ ଲାଲବାହାରି, ନାକରୁ ସିଂଘାଣି , ଆଖି ରୁ ଲୁହ ବାହାରିଥାଏ
- ଛେଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଦିଶେ
- ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ

ନିରାକରଣ :

- ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବ ରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଆଗଲେ ଏହି ରୋଗ ରୁ ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରା ଯାଇ ପାରିବ
- ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ଦର୍ଶାଯାଇ ଥିବା ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ

ବଜବଜିଆ

ଲକ୍ଷଣ :

- ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ
- ଭୋକ ହୁଏ ନାହିଁ
- ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଣ୍ଣ ଦିଶେ
- ଛୋଟାଏ ଏବଂ ଚଳ ପ୍ରଚଳ କରି ପାରେ ନାହିଁ
- ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ

ନିରାକରଣ :

- ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ରୋଗ ରେ ପଡି ମରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ କୁ ପୋତି ଦିଆ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଆଗଲେ ଏହି ରୋଗ ରୁ ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରା ଯାଇପାରିବ

ଛେଳି ମାନେ ଚରି ବୁଲି ଯେତିକି ପରିମାଣ ର ଖାଦ୍ୟସାର ପାଉଛନ୍ତି, ତାହାର ସବୁଜନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ବୋଦା, ଗର୍ଭବତୀ ଛେଳି ବଢିବା ଛେଳି ଛୁଆ କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରି ସୁସମ ଦାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ । ତେଣୁ ଦୈନିକ ଚରାଣୀ ଓ ଡାଳ ପତ୍ର କୁ ଛାଡି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନା ଦରକାର । ଏହି ଦାନା ପିଡିଆ, ଭୂଷି, ଚୋକଡ, ବିରି ଚୋପା, ମୁଗ ଚୋପା, କୋଲଥ ଚୋପା ଓ ଗୁଣ୍ଡ ଆଦି ରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦାନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆ ଗଲା :-

ମକା	କୋଲଥ	କୁଣ୍ଡା/ଚୋକଡ	ବାଦାମ ପିଡିଆ	ନାଇଜର ପିଡିଆ	ଧାତବ ଲବଣ	ଲୁଣ	ମୋଟ
35 ଭାଗ	10 ଭାଗ	30 ଭାଗ	11 ଭାଗ	12 ଭାଗ	1 ଭାଗ	1 ଭାଗ	100 ଭାଗ

ଉପରୋକ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ଦାନା ତିଆରି କରାଯାଇ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 225 ଗ୍ରାମ, ଦାନାକୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରେ ଅଧା କରି ଦେଲେ ଭଲ



ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଟୀକା						
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଟୀକା ର ନାମ	ଟୀକା ଦେବାର ସମୟ	ଟୀକା ପ୍ରଦାନ ର ବୟସ	ଟୀକାର ମାତ୍ରା ଓ ଦେବା ପ୍ରଣାଳୀ	ବୁଝର ଟୀକା ଦେବାର ବ୍ୟବଧାନ	ସୁରକ୍ଷା ସମୟ
1	ସାହାଣୀ ଟୀକା					
	(କ) ଆଲମ ଯୁକ୍ତ	ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନ	6 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	5 ମି.ଲି. ଚମଡ଼ା ତଳେ 273 କି.ଗ୍ରା . ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ମି.ଲି. ଚମଡ଼ା ତଳେ 273 କି.ଗ୍ରା . ଓଜନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ	6 ମାସ 6 ମାସ
	(ଖ) ଟେକସ୍‌ଯୁକ୍ତ	ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନ	6 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	2 ମି.ଲି. ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ 273 କି.ଗ୍ରା . ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମି.ଲି. ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ 273 କି.ଗ୍ରା . ଓଜନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ	1 ବର୍ଷ
2	ବଜବଜିଆ ଟୀକା	ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନ	6 ମାସ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା 2 ବର୍ଷ ରୁ କମ	5 ମି.ଲି. ଚମଡ଼ା ତଳେ (ଓ .ବି .ପି ଆଇ)	10ମ ଦିନ	6 ମାସ
3	ଆନ୍ତଃରାସ୍ତ୍ର ସାର ଟୀକା	ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନ	6 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	1 ମି.ଲି. ଚମଡ଼ା ତଳେ (ଓ .ବି .ପି ଆଇ)	ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ	1 ବର୍ଷ
4	ଫାଟୁଆ ଟୀକା					
	(କ) ଆଲମ ଯୁକ୍ତ	ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନ	3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	ମାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଫରକ	ପ୍ରଥମ ଟୀକାର 1 ମାସ ପରେ ଓ 6 ମାସ	6 ମାସ
	(ଖ) ଟେକସ୍‌ଯୁକ୍ତ	ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନ	3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	ମାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଫରକ	ପ୍ରଥମ ଟୀକାର 1 ମାସ ପରେ	1 ମାସ

ଛେଳି ମେଷା କ ଟୀକା						
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଟୀକା ର ନାମ	ଟୀକା ଦେବାର ସମୟ	ଟୀକା ପ୍ରଦାନ ର ବୟସ	ଟୀକାର ମାତ୍ରା ଓ ଦେବା ପ୍ରଣାଳୀ	ବୁଝର ଟୀକା ଦେବାର ବ୍ୟବଧାନ	ସୁରକ୍ଷା ସମୟ
1	ଏଣ୍ଟରୋଟୋକ୍ସିନିଆ ଟୀକା	ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନ	3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	2.5 ମି.ଲି. ଚମଡ଼ା ତଳେ (ଓ .ବି .ପି ଆଇ)	14 ଦିନ	1 ବର୍ଷ
2	ପି ପି ଆର ଟୀକା	ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନ	3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	1 ମି.ଲି. ଚମଡ଼ା ତଳେ (ଓ .ବି .ପି ଆଇ)	ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ	1 ବର୍ଷ
3	ବସଡ଼ ଟୀକା	ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନ	3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	2 ମି.ଲି. ଚମଡ଼ା ତଳେ (ଓ .ବି .ପି ଆଇ)	ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ	1 ବର୍ଷ
4	ଫାଟୁଆ ଟୀକା	ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନ	3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	ମାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଫରକ	ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ	6 ମାସ
5	ସାହାଣୀ ଟୀକା	ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନ	3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	2 ମି.ଲି. ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ (ଓ .ବି .ପି ଆଇ)	ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ	6 ମାସ
6	ବଜବଜିଆ ଟୀକା	ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନ	3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	2ରୁ 3 ମି.ଲି. ଚମଡ଼ା ତଳେ (ଓ .ବି .ପି ଆଇ)	10ମ ଦିନ	6 ମାସ
7	ଆନ୍ତଃରାସ୍ତ୍ର ଟୀକା	ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନ	3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ	1 ମି.ଲି. ଚମଡ଼ା ତଳେ (ଓ .ବି .ପି ଆଇ)	ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ	1 ବର୍ଷ

ଆଦର୍ଶ ବଗିଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

- ଚାଷିମାନଙ୍କୁ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କରିବା
- ବର୍ଷପାଣିକୁ କିପରି ସଂଚୟ ରକ୍ଷା କରିବା ।
- ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବା ।
- ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜୈବିକ ଖତସାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ।
- ଚାଷ ଦ୍ଵାରା ପରିବେଶକୁ ଯେପରି କ୍ଷତି ନ ଘଟାଇବା ।
- ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ କିପରି କରିବା ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜମିର ଅଭାବ ବୋଲି ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ସିମିତ କରିବା ।
- ଅଳ୍ପ ଜମିରେ ଅଧିକ ଅମଳ କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ ।
- ଚାଷି ତା'ର 70% ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି ନିଜ ଜମିରୁ ହିଁ ପାଇ ପାରିବ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କରାଇବା ।
- ଚାଷି ତା'ର ଚାଷ ଦ୍ଵାରା ପରିବେଶକୁ (ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି ଓ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ)କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ ।
- ଚାଷି ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବ ।

ଏହା କିପରି କରାଯାଏ

- ଜମିର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଜମିକୁ ସମାନ ଓଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ପ୍ରଥମ ଭାଗ :- ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଗଲମରିଚ ପାଇଁ ବାହୁଗଛ ଏବଂ ବଡ଼ ଆକାଶିଆ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।
- 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେଠାରେ ଗଲମରିଚ /କଫିଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।
- ଏହି ଗଛତଳେ ସପୁରୀ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।
- ପୁଣି ସେହି 30 ସେଣ୍ଟ ଜମିରେ ହଳଦୀ ଓ ସାରୁ ଲଗାଯାଇ ପାରେ ।
- ଦ୍ଵୀତିୟ ଭାଗ :- ଏହି ଭାଗକୁ ଫଳଗଛ ଭାଗ କୁହାଯାଇଥାଏ ।
- ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 10 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରକାରର ଗଛ (ଆମ୍ବ, ଲେମ୍ବୁ, ପିଙ୍କୁଳି, କଦଳୀ, ସାପଟା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ମୁନିଙ୍ଗା, ଲିଟୁ, ସିତାଫଳ, ତାଳିମ୍ବୁ ଏବଂ କମଳା) ଆଦି ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।
- ଏହି ଫଳଗଛରୁ ଫଳ ଅମଳ ପରେ ବର୍ଷାରୁତୁରେ ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ତୃତୀୟ ଭାଗ :- ଏହି ଭାଗରେ ଛୋଟ ଫସଲ ଯଥା- ମାଣ୍ଡିଆ, କାଙ୍ଗୁ, ମକା, ବାଜରା କିମ୍ବା ତାଳି ଜାତୀୟ ଫସଲ କିମ୍ବା ପିପ୍ପଳା ଆଦି ଫସଲ କରା ଯାଇଥାଏ ।
- ବାଉଁଶ :- ବାଉଁଶ ଭାଗରେ ଚାଷି ପ୍ରାୟ 3ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଚାଷ କରିଥାଏ । ପ୍ରଥମ- ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା, ଦ୍ଵୀତୀୟ – ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଏବଂ ତୃତୀୟ – ପବନ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ।



ମୋ ଚାଷ ପୋଥି



ରସୁଣ

କିସମ - ଦେଶୀ, ରାଜାଲେଗିଡ଼ି, ଯାମନଗର
ଲଗାଇବା ସମୟ - ଅକ୍ଟୋବର - ନଭେମ୍ବର
ବିହନ ପରିମାଣ - ଏକର ପ୍ରତି 150 କିଲୋଗ୍ରାମ ପାଖୁଡ଼ା ବା କୋଲା
ଲଗାଇବା ଦୂରତା - ଧାତିକୁ ଧାତି 15 ସେ.ମି., ଗଛକୁ ଗଛ 8 ସେ.ମି.
ଅମଳ - ଏକର ପ୍ରତି 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 50-60 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, 24 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର, 24 କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ ଓ 24 କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ଦରକାର । ଲଗାଇବାର ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ 10 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର ଓ 24 କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ଦରକାର ।

ରୋଗ/ପୋକ -

ପତ୍ର ଭକ୍ଷଣୀ ପୋକ - ଅଠାଳିଆ ଓ ଗନ୍ଧଯନ୍ତ୍ର ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ
ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ - (ଜିବାମୃତ ,ଚୂନ ଚୁଟିଆର ଦ୍ରବଣ)



ହଳଦୀ

କିସମ - ଦେଶୀ, ରଶ୍ମି, ରୋମ, ସୁରମା
ବୁଣିବା ସମୟ - ମେ - ଜୁନ
ବିହନ ପରିମାଣ - ଏକର ପ୍ରତି 8-10 କୁଇଣ୍ଟାଲ
ଲଗାଇବା ଦୂରତା - ଧାତି କୁ ଧାତି 30 ସେ. ମି., ଗଛ କୁ ଗଛ 20 ସେ.ମି .
ଅମଳ - ଏକର ପ୍ରତି - 80-100 କୁଇଣ୍ଟାଲ (କଞ୍ଚା) 30 କୁଇଣ୍ଟାଲ (ଶୁଖିଲା)

ଖତ /ସାର ର ପ୍ରୟୋଗ ଏକ ଏକର ପ୍ରତି -

ଲଗାଇଲାବେଳେ ଏକର ପ୍ରତି 50-60 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ।	ଏହାର ଦେହ ମାସ ପରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ - 12 କି.ଗ୍ରା.	ଲଗାଇବାର ତିନି ମାସ ପରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ - 12 କି.ଗ୍ରା.
ପଟାସ - 24 କି.ଗ୍ରା.		ଫସଫରସ -12 କି.ଗ୍ରା.
ଫସଫରସ -12 କି.ଗ୍ରା.		

ରୋଗ /ପୋକ

ମୂଳ ସଡ଼ା ରୋଗ -(ଗ୍ରାଇକୋଟର୍ମା ଭିରତି ଦେଇ କରିବା ମାଟି ଶୋଧନ)



ପିଆଜ

କିସମ - ନାସିକ ରେଡ, ଏନ -53, ପୁଷ୍ପା ରେଡ, ପାଟଣା ହାଇଡି ,ଏନ -57-1, ସରୁ ଛୋଟ ପିଆଜ- ଅର୍କ ବିନ୍ଦୁ, ରସ୍ସା, ଦେଶୀ
ଲଗାଇବା ସମୟ - ନଭେମ୍ବର , ଡିସେମ୍ବର
ବିହନ ପରିମାଣ - ଏକର ପ୍ରତି 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି
ଛୋଟ ପିଆଜ - 3-4 କୁଇଣ୍ଟାଲ କୋଲା ଲଗାଇବା ଦୂରତା - ଧାତିକୁ ଧାତି 15 ସେ.ମି., ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେ.ମି.
ଅମଳ - ଏକର ପ୍ରତି 70-80 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଫଳ

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 60-70 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, 24 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର ,24 କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ ଓ 20 କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ଦରକାର । ଲଗାଇବାର ତିନି - ଚାରି ସପ୍ତାହ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି 24.କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର ଓ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ ସାର ଦରକାର ।

ରୋଗ/ପୋକ- ଭକ୍ଷଣୀ ପୋକ -(ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋୟାଗ, ନିମାସ୍ତ)ପତ୍ର ପୋଡା ବା ପତ୍ର ବାଗ ରୋଗ । (ଜିବାମୃତ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ ଚୂନ ଚୁଟିଆର ଦ୍ରବଣ) (ଗ୍ରାଇକୋଟର୍ମା ଭିରତି ଦେଇ କରିବା ମାଟି ଶୋଧନ)ଅମଳ -ଏକର ପ୍ରତି 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଲିପିଆଜ ଓ 40-50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଶୀ ପିଆଜ ।

ରୋଗ/ପୋକ - ଝାଉଁଳା ରୋଗ । - (ଗ୍ରାଇକୋଟର୍ମା ଭିରତି ଦେଇ କରିବା ମାଟି ଶୋଧନ)

(ଜିବାମୃତ , ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ ଚୂନ ଚୁଟିଆର ଦ୍ରବଣ)

ଫଳ ମାଛି ପୋକ । -(ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋୟାଗ , ନିମାସ୍ତ)



ଆଳୁ

କିସମ : କୃତ୍ରି ତନ୍ମୁଖୀ . କୃତ୍ରି ଜ୍ୟୋତି ,କୃତ୍ରି ଚମକାର , କେ -22, କୃତ୍ରି ସିନ୍ଦୂର , କୃତ୍ରି ଅଳଙ୍କାର , କୃତ୍ରି ଅଶୋକ
ଲଗାଇବା ସମୟ - ଅକ୍ଟୋବର - ନଭେମ୍ବର
ବିହନ ପରିମାଣ - ଏକର ପ୍ରତି - 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ
ଲଗାଇବା ବ୍ୟବଧାନ - ଧାତିକୁ ଧାତି 45 ସେ.ମି., ଗଛ କୁ ଗଛ 15-20 ସେ.ମି.
ଅମଳ - ଏକର ପ୍ରତି 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ।

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 60 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ , 16 କ.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ , 24 କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ ଓ 24 କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ଆବଶ୍ୟକ । ଲଗାଇବାର 3-4 ସପ୍ତାହ ପରେ 16 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଆବଶ୍ୟକ , ଏହାର 15 ଦିନ ପରେ 16 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ 24 କି.ଗ୍ରା.ପଟାସ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ।

ରୋଗ /ପୋକ-

ସଅଳ ପତ୍ର ପୋଡା ଓ ଭକ୍ଷର ପତ୍ର ପୋଡା । - (ଗ୍ରାଇକୋଟର୍ମା ଭିରତି ଦେଇ କରିବା ମାଟି ଶୋଧନ)
କର୍ତ୍ତକ କୀଟ - (ନିମାସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ, ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋୟାଗ)



ଟମାଟୋ

କିସମ- ଦେଶୀ, ପୁଷା ରୁବି, କେଶରୀ, ପଞ୍ଜାବ ଛୁଆର, ଉତ୍କଳ କୁମାରୀ
 ଲଗାଇବା ସମୟ- ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର- ଡିସେମ୍ବର
 ବିହନ ପରିମାଣ- ଏକର ପ୍ରତି 200 ଗ୍ରାମ
 ଲଗାଇବା ଦୂରତା- ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 45-60 ସେ.ମି., ଗଛକୁ ଗଛ 30-45 ସେ.ମି.
 ଅମଳ- ଏକର ପ୍ରତି 80-100 କୁଇଣ୍ଟାଲ

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ଚାଉଳ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 60-70 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, 25 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର, 30 କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ ଓ 25 କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ଦରକାର । ଲଗାଇବାର ଚାରି ସପ୍ତାହ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି 25 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର ସାର 16 କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ଦରକାର ।

ରୋଗ/ପୋକ -

ପତ୍ର ପୋଡା ରୋଗ । ଝାଉଁଳା ରୋଗ । (କିବାମୃତ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ ତୁନ ତୁଟିଆର ଦ୍ରବଣ)
 ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ । (ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋଥାଗ, ନିମାସ୍ତ୍ର, ପିତା, ଅଠାଳିଆ ଓ ଗନ୍ଧଯନ୍ତ୍ର ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ)



ବିଟ୍

କିସମ - କ୍ରିମସନ ଗ୍ଲୋବ, ଡାର୍କ ରେଡ୍, ଡାଏନା ।
 ବୁଣିବା ସମୟ - ଅକ୍ଟୋବର - ନଭେମ୍ବର
 ବିହନ ପରିମାଣ - ଏକର ପ୍ରତି 2 କିଲୋଗ୍ରାମ
 ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଦୂରତା - ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 30 ସେ.ମି., ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେ.ମି.
 ଅମଳ - ଏକର ପ୍ରତି 40-50 କୁଇଣ୍ଟାଲ

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 30-40 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, 10 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର, 20 କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ ଓ 40 କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ଦରକାର । ଲଗାଇବାର ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି 10 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର ସାର ଦରକାର ।

ରୋଗ/ପୋକ -

ପତ୍ର ପୋଡା ରୋଗ - (କିବାମୃତ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ ତୁନ ତୁଟିଆର ଦ୍ରବଣ)
 (ଡ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରଡି ଦେଇ କରିବା ମାଟି ଶୋଧନ)
 ପତ୍ର ଉକୁଣୀ ପୋକ, ଜଉ ପୋକ - (ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋଥାଗ, ନିମାସ୍ତ୍ର)



ଗାଜର

କିସମ - ଇଣ୍ଡିଆ ଆର- 13, ପୁଷାକେଶର, ଅଲିନେଷ୍ଟସ, କୋରଲେସ, ଟାଁଗାଣି
 ବୁଣିବା ସମୟ - ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଡିସେମ୍ବର
 ବିହନ ପରିମାଣ - ଏକର ପିଛା 2 କିଗ୍ରା.
 ବୁଣିବା ବ୍ୟବଧାନ - ଗଛକୁ ଗଛ- 10 ସେ.ମି., ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି- 30 ସେ.ମି.
 ଅମଳ - ଏକର ପ୍ରତି 40-50 କୁଇଣ୍ଟାଲ

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, 10 କିଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 20 କିଗ୍ରା ଫସଫରସ ଓ 30 କିଗ୍ରା: ପଟାସ ସାର ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାର 4 ସପ୍ତାହ ପରେ 10 କିଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଦରକାର ।

ରୋଗ /ପୋକ

(ଡ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରଡି ଦେଇ କରିବା ମାଟି ଶୋଧନ)ପତ୍ରଖୁଆ ପୋକ, ଘୁଣି ପୋକ- (ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋଥାଗ, ନିମାସ୍ତ୍ର



ମୂଳା

କିସମ - କୋଏମ୍ବାର୍‌ଟୁର ଲଙ୍ଗ, ପୁଷା, ବୋମ୍ବେୟମ୍‌1, ଲଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ, ଦେଶୀ ।
 ଲଗାଇବା ସମୟ - ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଫେବୃଆରୀ ,ମାର୍ଚ୍ଚ ।
 ବିହନ ପରିମାଣ - ଏକର ପ୍ରତି 2 କିଗ୍ରା ।
 ଲଗାଇବା ଦୂରତା - ଧାଡ଼ି କୁ ଧାଡ଼ି 120 ସେ.ମି., ଗଛ କୁ ଗଛ 120 ସେ.ମି.
 ଅମଳ - ଏକର ପ୍ରତି 25-30 କୁଇଣ୍ଟାଲ ।

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ବିହନ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମହା ପ୍ରତି 1 ଝୁଡ଼ି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, ଏକର ପ୍ରତି 10 କିଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 12 କିଗ୍ରା ଫସଫରସ ଓ 20 କିଗ୍ରା: ପଟାସ ସାର ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାର 3 ସପ୍ତାହ ପରେ 10 କିଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଦରକାର ।

ରୋଗ /ପୋକ -

ଫଳ ମାଛି ।
 ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ।



ରାଣି (ଖସା)

କିସମ- ଦେଶୀ, ବିନାୟକ, କନକ, କାଳିକା, କ୍ରିଷ୍ଣା
 ବୁଣିବା ସମୟ- ଜୁନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର- ଅକ୍ଟୋବର, ଜାନୁୟାରୀ- ଫେବୃଆରୀ
 ବିହନ ପରିମାଣ- ଏକର ପ୍ରତି 4 କିଲୋଗ୍ରାମ
 ବୁଣିବା ଦୂରତା- ଧାତିକୁ ଧାତି 30 ସେ.ମି., ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେ.ମି.
 ଅମଳ- ଏକର ପ୍ରତି 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ବୁଣିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 30-40 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, 6 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର, 6 କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ ଓ 6 କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ଦରକାର । ଲଗାଇବାର ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ 6 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର ଦରକାର ।

ରୋଗ/ପୋକ -

ପତ୍ର ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ- (ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋକ୍ସାଗ, ନିମାସ୍ତ୍ର, ପିତା, ଅଠାଳିଆ ଓ ଗନ୍ଧଯନ୍ତ୍ର ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ)ବନ୍ଧ୍ୟା
 ରୋଗ I- (ଜିବାମୃତ, ତୁନ ତୁଟିଆର ଦ୍ରବଣ)



ବୁଟ

କିସମ- ଦେଶୀ, ରାଧେ, ଆନେଗିରି
 ବୁଣିବା ସମୟ- ଅକ୍ଟୋବର- ନଭେମ୍ବର
 ବିହନ ପରିମାଣ- ଏକର ପ୍ରତି 25 କିଲୋଗ୍ରାମ
 ଲଗାଇବା ଦୂରତା- ଧାତିକୁ ଧାତି 30 ସେ.ମି., ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେ.ମି.
 ଅମଳ- ଏକର ପ୍ରତି 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 40-50 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, 10 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର, 16 କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ ସାର ଦରକାର ।

ରୋଗ/ପୋକ -

ଛୁଇଁ ବିନ୍ଧା ପୋକ (ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋକ୍ସାଗ, ନିମାସ୍ତ୍ର)କର୍ତ୍ତକ କୀଟ



ମୁଗ

କିସମ- ଦେଶୀ, ପୂଷା, ବୈଶାଖୀ, ଜ୍ୟୋତି, ସୁଜାତା, ଟି- 44, ଧଉଳି
 ବୁଣିବା ସମୟ- ଜୁନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଜାନୁୟାରୀ- ଫେବୃଆରୀ
 ବିହନ ପରିମାଣ- ଏକର ପ୍ରତି 10 କିଲୋଗ୍ରାମ
 ବୁଣିବା ଦୂରତା- ଧାତିକୁ ଧାତି 20 ସେ.ମି., ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେ.ମି.
 ଅମଳ- ଏକର ପ୍ରତି 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ବୁଣିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 30-40 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, 8 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର, 16 କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ ସାର ଦରକାର । ବୁଣିବା ସମୟରେ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ଗୋଳାଇ ବୁଣିବା ଦରକାର ।

ରୋଗ/ପୋକ -

ଜଉ ପୋକ- (ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋକ୍ସାଗ, ନିମାସ୍ତ୍ର) ପାଇଁଶିଆ ରୋଗ- (ଜିବାମୃତ, ତୁନ ତୁଟିଆର ଦ୍ରବଣ)



ହରଡ଼

କିସମ- ଦେଶୀ, ଏସ- 5, ମୁକ୍ତା, ଉପାସ-120, ପ୍ରଗତି, ଜାଗୃତି
 ବୁଣିବା ସମୟ- ଜୁନ- ଜୁଲାଇ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର
 ବିହନ ପରିମାଣ- ଏକର ପ୍ରତି 6-8 କିଲୋଗ୍ରାମ ।
 ବୁଣିବା ଦୂରତା- ସଅଳ କିସମ- 45 ସେ.ମି., 20 ସେ.ମି.
 ବିଲମ୍ବ କିସମ- 60 ସେ . ମି X 20 ସେ.ମି.
 ଅମଳ- ଏକର ପ୍ରତି- 7-8- କିଣ୍ଟାଲ

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 30-40 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ।
 ଯବକ୍ଷାରଜାନ- 8 କି.ଗ୍ରା. ।
 ଫସଫରସ- 16 କି.ଗ୍ରା. ।

ରୋଗ/ପୋକ -

ବାୟୁଆ ପୋକ- (ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋକ୍ସାଗ, ନିମାସ୍ତ୍ର, ପିତା, ଅଠାଳିଆ ଓ ଗନ୍ଧଯନ୍ତ୍ର ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ)ଛୁଇଁ
 ବିନ୍ଧା ପୋକ, ଜଉ ପୋକ- (ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋକ୍ସାଗ, ନିମାସ୍ତ୍ର, ପିତା, ଅଠାଳିଆ ଓ ଗନ୍ଧଯନ୍ତ୍ର ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ)



କୋଳଥ

କିସମ- ଡିଏସ 1-2, ଡିଏସ- 2, ଉମି, ଦେଶୀ- ଧଳା, ଦେଶୀ-କଳା
 ବୁଣିବା ସମୟ- ସେପ୍ଟେମ୍ବର- ଅକ୍ଟୋବର
 ବିହନ ପରିମାଣ- ଏକର ପ୍ରତି 20 କି.ଗ୍ରା.
 ବୁଣିବା ଦୂରତା- ହାତ ବୁଣା ଏବଂ ଧାତିକୁ ଧାତି 30 ସେ.ମି.
 ଅମଳ- ଏକର ପ୍ରତି 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ |

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ବୁଣିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 15-20 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, ଓ 5 କି.ଗ୍ରା., ଯବକ୍ଷାରଜାନ 10 କି.ଗ୍ରା
 ଫସଫରସ ସାର ଆବଶ୍ୟକ |

ରୋଗ/ପୋକ -

ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ, ସାହେବୀ ରୋଗ (ଜିବାମୃତ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ ତୁନ ତୁଟିଆର ଦ୍ରବଣ)
 ଜଉ ପୋକ (ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋଥାଗ, ନିମାସ୍ତ)



ବିରି

କିସମ- ଦେଶୀ, ଟି- 9, ଡି ପି ଯୁ- 1, କେ ଯୁ- 1, ଶାରଳା, କେ-10 |
 ବୁଣିବା ସମୟ- ଜୁନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର- ଅକ୍ଟୋବର |
 ବିହନ ପରିମାଣ- ଏକର ପ୍ରତି 10 କିଲୋଗ୍ରାମ |
 ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଦୂରତା- ଧାତିକୁ ଧାତି 30 ସେ.ମି., ଗଛକୁ ଗଛ 15 ସେ.ମି.
 ଅମଳ- ଏକର ପ୍ରତି 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ |

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 30-40 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, 8 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର, 16 କି.ଗ୍ରା.
 ଫସଫରସ ସାର ଦରକାର । ମଞ୍ଜିକୁ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ସହିତ ଗୋଳାଇ ବୁଣିବା ଉଚିତ ।

ରୋଗ/ପୋକ -

ଜଉ ପୋକ- (ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋଥାଗ, ନିମାସ୍ତ)
 ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ- (ଜିବାମୃତ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ ତୁନ ତୁଟିଆର ଦ୍ରବଣ)



ମସୂର

କିସମ- ବି- 77, ପୁଷା- 8, ଟି- 36, ପଛ 206, ପଛ 209
 ବୁଣିବା ସମୟ- ଅକ୍ଟୋବର- ନଭେମ୍ବର
 ବିହନ ପରିମାଣ- ଏକର ପ୍ରତି 16 କିଲୋଗ୍ରାମ
 ବୁଣିବା ଦୂରତା- ଧାତିକୁ ଧାତି 30 ସେ.ମି., ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେ.ମି.
 ଅମଳ- ଏକର ପ୍ରତି 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 30-40 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, 8 କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାର, 16 କି.ଗ୍ରା.
 ଫସଫରସ ସାର ଦରକାର । ମଞ୍ଜିକୁ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ସହିତ ଗୋଳାଇ ବୁଣିବା ଉଚିତ ।

ରୋଗ/ପୋକ -

ଝାଉଁଳା ରୋଗ- (ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ, ତୁନ ତୁଟିଆର ଦ୍ରବଣ)
 ଜଉ ପୋକ, ଛୁଇଁ ବିନ୍ଧା ପୋକ- (ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋଥାଗ, ନିମାସ୍ତ)



ସୋରିଷ

କିସମ- ଏ ମ- 27, ପିଟି- 303, ଟି- 9, ବିନୟ ପୁଷା ବୋଲଡ,
 ଅନୁରାଧା ପାବତୀ
 ବୁଣିବା ସମୟ- ଅକ୍ଟୋବର
 ବିହନ ପରିମାଣ- ଏକର ପ୍ରତି 3 କିଲୋଗ୍ରାମ
 ଲଗାଇବା ଦୂରତା- ଧାତି କୁ ଧାତି 20-30 ସେ.ମି., ଗଛ କୁ ଗଛ 10 ସେ.ମି.
 ଅମଳ- ଏକର ପ୍ରତି- 4-5 କୁଣ୍ଡାଲ

ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ଅଣ-ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ବୁଣିବାବେଳେ
 ଏକର ପ୍ରତି 50-60 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ।
 ଯବକ୍ଷାରଜାନ- 12 କି.ଗ୍ରା
 ପଟାସ- 06 କି.ଗ୍ରା.
 ଫସଫରସ- 06 କି.ଗ୍ରା.

ରୋଗ/ପୋକ -

ଜଉ ପୋକ- (ନିମ ତେଲ ପ୍ରୋଥାଗ, ନିମାସ୍ତ, ପିତା, ଅଠାଳିଆ ଓ ଗନ୍ଧଯନ୍ତ୍ର ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ)
 କଳକି ରୋଗ- (ଜିବାମୃତ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରର ଦ୍ରବଣ, ତୁନ ତୁଟିଆର ଦ୍ରବଣ)

ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ବୁଣିବାବେଳେ
 ଯବକ୍ଷାରଜାନ- 12 କି.ଗ୍ରା
 ପଟାସ- 12 କି.ଗ୍ରା.
 ଫସଫରସ- 12 କି.ଗ୍ରା.



କୋଳଥ

କିସମ - କୋଏମ୍ବାର୍ କୋଳଥ, ପୁଷା, ବୋମୌସୁମୀ, ଲଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ, ଦେଶୀ |
 ଲଗାଇବା ସମୟ - ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ |
 ବିହନ ପରିମାଣ - ଏକର ପ୍ରତି 2 କିଗ୍ରା |
 ଲଗାଇବା ଦୂରତା - ଧାତି କୁ ଧାତି 120 ସେମି., ଗଛ କୁ ଗଛ 120 ସେମି.
 ଅମଳ - ଏକର ପ୍ରତି 25-30 କୁଇଣ୍ଟାଲ |

ଝଡ଼ ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ବିହନ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମହା ପ୍ରତି 1 ଟ୍ରଟି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଝଡ଼, ଏକର ପ୍ରତି 10 କିଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 12 କିଗ୍ରା ଫସଫରସ ଓ 20 କିଗ୍ରା: ପଟାସ ସାର ଆବଶ୍ୟକ | ଏହାର 3 ସପ୍ତାହ ପରେ 10 କିଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଦରକାର |

ରୋଗ /ପୋକ -

ଫଳ ମାଛି |
 ପତ୍ର ବାଗ ରୋଗ |



ବିରି

କିସମ - ଦେଶୀ
 ବିହନ ପରିମାଣ - ଏକର ପ୍ରତି 4000 ବୁଦା,
 ଶତକଡ଼ା 10 ଭାଗ ଅଣ୍ଡିରା ଗଛ ରହିବା ଦରକାର |
 ଲଗାଇବା ଦୂରତା - ଧାତିକୁ ଧାତି 1 ମି., ଗଛକୁ ଗଛ 1ମି.
 ଅମଳ - ଏକର ପିଛା 50-60 କୁଇଣ୍ଟାଲ |

ଝଡ଼, ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ଲଗେଇବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଝଡ଼, 12 କିଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 16 କିଗ୍ରା ଫସଫରସ ଓ 16 କିଗ୍ରା: ପଟାସ ସାର ଦରକାର | ଏହାର 4 ସପ୍ତାହ ପରେ 12 କିଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଦରକାର |

ରୋଗ /ପୋକ -

କାଙ୍କଡ଼ିଆ ପୋକ
 ପତ୍ର ବାଗ ଓ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ |



ମସୂର

କିସମ - ପୁଷା ସଫେଦ, ପୁଷାଲାଲ, ଏଚ -41, ଏସ ପି -9,
 ଦେଶୀ ରେଡ଼, ଦେଶୀ ହାଇଡ୍ରା |
 ଲଗାଇବା ସମୟ - ଜୁନ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର |
 ବିହନ ପରିମାଣ - ଏକର ପ୍ରତି 28000 ଖଣ୍ଡ ଡାଳ |
 ଲଗାଇବା ଦୂରତା - ଧାତିକୁ ଧାତି 60 ସେମି., ଗଛକୁ ଗଛ 25 ସେମି.
 ଅମଳ - ଏକର ପ୍ରତି 80 କୁଇଣ୍ଟାଲ |

ଝଡ଼ ,ସାର ପ୍ରୟୋଗ -

ଲଗେଇବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଝଡ଼ , 10 କିଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ , 20 କିଗ୍ରା ଫସଫରସ ଓ 30 କିଗ୍ରା: ପଟାସ ସାର ଆବଶ୍ୟକ | ଏହାର 4 ସପ୍ତାହ ପରେ 10 କିଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଦରକାର |

ରୋଗ /ପୋକ -

ପତ୍ରଖୁଆ ପୋକ
 ଘୁଣି ପୋକ



କଦଳୀ

କିସମ - ପାଟିଲା -ଚମ୍ପା, ପାଟକପୁରା, କାବୁଲି, ରୋବଣ୍ଡା, କଞ୍ଚା- ବଡ଼ଳ,
 ପାଉଁଶିଆ ବଡ଼ଳ , ଗଜ ବଡ଼ଳ ,ଦକ୍ଷୀଣ ସାଗର ,ଦେଶୀ |
 ଲଗାଇବା ସମୟ - ଜୁନ - ଜୁଲାଇ |
 ଲଗାଇବା ବ୍ୟବଧାନ - ଡେଙ୍ଗା ଗଛ - 2ମି. x 2ମି., ଗେଡ଼ା
 ଗଛ - 1.8ମି . X 1.8 ମି .
 ଗାତର ଆକାର - 50ସେ.ମି. x 50ସେ.ମି. x 50ସେ.ମି.
 ଅମଳ - ଏକର ପ୍ରତି 200 ରୁ 250 କୁଇଣ୍ଟାଲ |


ଝଡ଼ ସାର ପ୍ରୟୋଗ- ଲଗାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରତି ଗାତରେ 1 ଟ୍ରଟି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଝଡ଼ ଦେବା ଦରକାର ।
 (ଗଛ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ସାର-)

	ଯବକ୍ଷାରଜାନ	ଫସଫରସ	ପଟାସ
ଲଗାଇବା ବେଳେ	25	30	100
2 ମାସ ପରେ	25	30	100
3 ମାସ ପରେ	40	--	--
4 ମାସ ପରେ	--	25	100

ରୋଗ/ପୋକ- ପତ୍ର ଚିତା ରୋଗ । ସିଗାଟୋକା ରୋଗ ।

ଗୋଷ୍ଠି ପରିଚାଳିତ ବିହନ କେନ୍ଦ୍ର

ସହାୟତାକାରୀ ସଂସ୍ଥା



ସୋହଯୋଗକାରି ସଂସ୍ଥା



ବିହନ କେନ୍ଦ୍ର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ





ଗୋବର



ଗୋମୁତ୍ର



ପଲିଥିନ ଚାଦର



ଗୁଡ଼



ଡାଲି ତୁନା



ଭଲ ହୁଙ୍କା ମାଟି

ଘନ ଜୀବାମୃତ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ

- ଏକ ସପ୍ତାହର ଗୋବର - ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା
- ଗୁଡ଼ - ୨ କି.ଗ୍ରା
- ବେସନ କିମ୍ବା ବିରିତୁନା - ୨ କି.ଗ୍ରା କିମ୍ବା ମୁଗତୁନା
- ଭଲ ହୁଙ୍କା ମାଟି କିମ୍ବା - ୧ ମୁଠା ବର ଗଛ ତଳମାଟି
- ଗୋମୁତ୍ର - ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାଇ
- ପଲିଥିନ ଚାଦର - ୧ ଟି

ଉପାଦେୟତା

ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଣୁଜୀବର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଫସଲକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟସାର ମିଳିବା ପାଇଁ ଏହି ଘନ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ସହଜରେ ମିଳିପାରେ। ଛୋଟ ଓ ନାମ ମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗୋବର, ଗୁଡ଼, ଡାଲି ତୁନା ଏବଂ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ ପଲିଥିନ ଚାଦର ଉପରେ ମିଶାନ୍ତୁ ।
ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ଗୋମୁତ୍ରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶାନ୍ତୁ, ଯେପରି କି ଏହା ଏକ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ।
ଏହାକୁ ଘଷି ପାରିଲାପରି ପାରି ଛାଇ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ ଛାଇ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଖୋଳାଇ ଶୁଖାନ୍ତୁ ।

ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ


୧୦କେ.ଜି ଘନ ଜୀବାମୃତକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ୧୦୦କେ.ଜି ସଜା ଗୋବର ଖତରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ । ଶେଷ ଥର ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଗୋବର



ଗୋମୁତ୍ର



ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡ୍ରମ



ଗୁଡ଼



ଡାଲି ଚୁନା



ଭଜା ହୁଙ୍କା ମାଟି

ଜୀବାମୃତ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ

- ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡ୍ରମ - ୨୦୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଜଳ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିବ
- କଞ୍ଚା ଗୋବର - ୧୦ କି.ଗ୍ରା.
- ଗୋମୁତ୍ର - ୫ ରୁ ୧୦ ଲିଟର
- ଗୁଡ଼ - ୨ କି.ଗ୍ରା.
- ଡାଲି ଚୁନା - ୨ କି.ଗ୍ରା.
- ଭଜା ହୁଙ୍କା ବା ବରଗଛ ତଳ ଉର୍ବର ମାଟି - ୧ କି.ଗ୍ରା.

ଉପାଦେୟତା

ଏକ ଡ୍ରମରେ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ । ଉପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଡ୍ରମର ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଏକ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ । ଏହି ପରି ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ ,ଏହାହାରା ଗୋବର, ଗୋମୁତ୍ର ଏବଂ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ରଣ ଜୀବାମୃତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

ଡ୍ରମରୁ ଜୀବାମୃତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି, ୯ ରୁ ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଜଳ ସେଚନ ସମୟରେ ସେତିକି ଜଳ ସହ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ପ୍ରବାହିତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଲିଟର ଜୀବାମୃତକୁ ଗୋଳାଇ ସିଂଚନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଫଳଗଛ ବା ଫୁଲଗଛ ଆଦିର ମୂଳରେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଆଦ୍ରତା ଥିବା ସମୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ

ଗୁଡ଼କୁ ଡ୍ରମର ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ବା ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ମିଶାନ୍ତୁ । ଡାଲିଚୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇ ଗୋଳାଇ ମିଶାନ୍ତୁ । ଯଦି ଏହି ଦୁଇ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସିଧାସଳଖ ଡ୍ରମରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଇବେ ତାହା ବିଷ୍ଟା ହୋଇ ଯିବ ।



ହାଣ୍ଡି ଗତ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ

- ବଡ଼ ମାଠିଆ - ଆନୁମାନିକା (୫ - ୬ ଲିଟର କ୍ଷମତା) - ୧ଟା
- ଦୁଇ ଦିନର ଗୋବର - ୧ କି.ଗ୍ରା.
- ଗୋମୁତ୍ର - ୫ ଲିଟର
- ଗୁଡ଼ - ୫୦ ଗ୍ରାମ
- କରଞ୍ଜ ପତ୍ର - ୧ କି.ଗ୍ରା.
- ନିମ୍ବ ପତ୍ର - ୧ କି.ଗ୍ରା.
- ଅରଖ ପତ୍ର - ୧ କି.ଗ୍ରା.
- ବାଡ଼ି - ୧ଟି
- ଛଣା କପଡ଼ା - ୧ ଟି

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

ନିମ୍ବ, ଅରଖ ଓ କରଞ୍ଜ ପତ୍ରକୁ ଚିକି ଚିକି କରି କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପକାନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୋବର, ଗୋମୁତ୍ର ଏବଂ ଗୁଡ଼କୁ ମାଠିଆରେ ପକାଇ ଏକ ବାଡ଼ି ହାରା ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ । ପରେ ମାଠିଆର ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ୧୦ ଦିନ ଏକ ନିରାପଦ ଓ ଛାଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ମାଠିଆ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ୧୦ ଦିନପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଏକ ଛଣା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ତରଳ ହାଣ୍ଡିଖତକୁ ଛାଣନ୍ତୁ । ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ । ମାଠିଆରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏଥିରେ ୫ ଲିଟର ଗୋମୁତ୍ର ମିଶାଇ, ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ପୁଣି ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହିପରି ତରଳ ହାଣ୍ଡିଖତ ନିଷ୍କାସନ କରି ଓ ଗୋମୁତ୍ର ପୁନର୍ବାର ମିଶାଇ ଏହାକୁ ତିନିଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ । ତିନିଥର ବ୍ୟବହାର ପରେ ମାଠିଆରେ ଥିବା ଖତକୁ ଜମିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ

ମାଣ୍ଡିଆ ରୋପାର ୨୦-୩୦ ଦିନ ପରେ ୧ ଲିଟର ହାଣ୍ଡିଖତରେ ୪୦ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ପ୍ରତିକ୍ଷେପକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ଲାଗିରେ ୧ ଲିଟର ହାଣ୍ଡିଖତରେ ୨୦ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏହା ପତ୍ରକଟା ପୋକ, ନଳିପୋକ, ଲେଡାପୋକ, ପତ୍ରମୋଡା ପୋକ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରେ ।

୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ମି.ଲି. ହାଣ୍ଡିଖତ ମିଶାଇ ଯେ କୌଣସି ବିହନ କୁ ୧୫ ରୁ ୨୦ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁରାଇ ବୁଣିପାରିବା । ଏହା ଫସଲକୁ କବକ ଓ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।



ବହୁସ୍ୱ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ

- ବଡ଼ ମାଠିଆ - ଆନୁମାନିକ (୫ - ୭ ଲିଟର କ୍ଷମତା) - ୧ଟା
- ଆତ ପତ୍ର - ୨ କି.ଗ୍ରା.
- ଗୋମୁତ୍ର - ୧୦ ଲିଟର
- ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର - ୨ କି.ଗ୍ରା.
- ଡାଳିମ୍ବ ପତ୍ର - ୧ କି.ଗ୍ରା.
- ନିମ୍ବ ପତ୍ର - ୩ କି.ଗ୍ରା.
- ପିଜୁଳି ପତ୍ର - ୨ କି.ଗ୍ରା.

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡ୍ରମ ନିଅନ୍ତୁ । ସେଥିରେ ୧୦ ଲିଟର ଗୋମୁତ୍ର ଢାଳନ୍ତୁ । ୩ କି.ଗ୍ରା. ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଛେଚି ଏହାର ମଣ୍ଡକୁ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ସେଥିରେ ୨ କି.ଗ୍ରା. ଆତ ପତ୍ର ମଣ୍ଡ , ୨ କି.ଗ୍ରା. ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ପତ୍ର ମଣ୍ଡ, ୨ କି.ଗ୍ରା. ଡାଳିମ୍ବ ପତ୍ର ମଣ୍ଡ, ୨ କି.ଗ୍ରା. ପିଜୁଳି ପତ୍ର ମଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ୩୦ ମିନିଟ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ୧ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ । ମିଶ୍ରଣଟି ଥଣ୍ଡା ହେଲାପରେ ଗୋଟିଏ ପତଳା କପଡ଼ାରେ ଛାଣି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରମର ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ

୧ ଲିଟର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ୫୦ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଏହି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ, ଶୋଷକ ପୋକ, ସାଆଁବାଳୁଆ ପୋକ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥାଏ ।

ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପନିପରିବା, ଫଳ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାରିବେ ।

ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଦିନରୁ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ ।

